



TERGENT AB
Mörsaregatan 11
254 66 Helsingborg
Tel: 042-311 06 00
info@tergent.se
www.tergent.se



MyrNIX™

Bekämpningsmedel mot myror, silverfiskar, kvalster och andra krypande skadeinsekter

VARFÖR

- Ohyran kan inte bli resistent mot MyrNIX
- Ren naturprodukt – 100% kiselgur
- Fri från nervgift
- Används av proffs inom skadedjursbekämpning

VAD

- Bekämpar myror, silverfiskar, kackerlackor, väggglöss, kvalster och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur

VAR

- Överallt där myror och andra krypande skadeinsekter förekommer inomhus och utomhus

HUR

- Strö ut ett tunt lager där ohyran förekommer



Rekommenderas
& används av
PROFFS
inom skadedjurs-
bekämpning

UNIK PRODUKT
**FRI FRÅN
NERVGIFT**

**GODKÄND FÖR
EKOLOGISK
ODLING**



Om MyrNIX

Bekämpar myror och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur, exempelvis silverfiskar och kvalster. MyrNIX kan användas överallt där myror och andra krypande skadeinsekter förekommer, exempelvis runt odlingslådor, stenläggningar, uterummet, i kök, skafferier, altaner och andra förvaringsutrymmen. MyrNIX består av ett mycket finmalt fossilt stenmjöl (diatomit/kiselgur). Pulvret fastnar på myrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och ohyran torkar ut – därmed kan inte ohyran bli resistent. MyrNIX rekommenderas och används av proffs.

Gör så här

Mot krypande insekter inomhus: Applicera MyrNIX (7 g/m²) i springor och håligheter, såsom bakom golvlistor och skåp, där insekter gömmer sig, på deras vandringsstråk samt direkt på insekterna om möjligt. Barriärbehandla insekternas ingångar och stråk med MyrNIX (7 g/m) som läggs i en rad med 1-3 cm bredd (max 2 m per dag). Vid behov upprepa behandlingen tidigast efter 7 dagar.

Mot myror utomhus: Applicera 5 g MyrNIX per myrbo, jämnt fördelat över boets ingångar. Barriärbehandla insekternas ingångar och stråk med MyrNIX (7 g/m) som läggs i en rad med 1-3 cm bredd. Upprepa behandlingen vid behov om all produkt burits bort av myrorna (tidigast efter 24 h). Högst 3 behandlingar per bo.

Mot röda hönskvalster i hönshus: Före applicering ska hönshuset vara tomt på fjäderfä och rengjort. Applicera därefter MyrNIX (50 g/m²) på hönshusets alla ytor, springor, håligheter och gångstråk där kvalstren kan gömma sig. Applicera på kvalstren direkt om möjligt. Upprepa behandling tidigast efter 7 dagar vid behov. Behandling kan göras förebyggande och av pågående utbrott. Beroende på angreppets omfattning och antal individer ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. Vid uppstädning och vid spridning till önskad plats dammsug eller torka upp med fuktig trasa. Bäst effekt uppnås när produkten är torr. MyrNIX löses inte upp i vatten och kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet avdunstar.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd insekticiden på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Verksamt ämne: Kiselgur 100% **CAS:** 61790-53-2

Behörighetsklass: 1 So, 2,3.

Insekticid klass 3 reg.nr: 5754-1-1

MyrNIX levereras i 200 g flaska med pip för enkel spridning på svåråtkomliga ytor.