



TERGENT AB
Mörsaregatan 11
254 66 Helsingborg
Tel: 042-311 06 00
info@tergent.se
www.tergent.se



MyrNIX™

Bekämpningsmedel mot myror, silverfiskar, kvalster och andra krypande skadeinsekter

VARFÖR

- Ohyran kan inte bli resistent mot MyrNIX
- Ren naturprodukt – 100% kiselgur
- Fri från nervgift
- Används av proffs inom skadedjursbekämpning

VAD

- Bekämpar myror, silverfiskar, kackerlackor, vägglöss, kvalster och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur

VAR

- Överallt där myror och andra krypande skadeinsekter förekommer inomhus och utomhus

HUR

- Strö ut ett tunt lager där ohyran förekommer



Rekommenderas & används av
PROFFS
inom skadedjurs-
bekämpning

UNIK PRODUKT
**FRI FRÅN
NERVGIFT**

GODKÄND FÖR
EKOLOGISK
ODLING



Om MyrNIX

Bekämpar myror och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur, exempelvis silverfiskar och kvalster. MyrNIX kan användas överallt där myror och andra krypande skadeinsekter förekommer, exempelvis runt odlingslådor, stenläggningar, uterummet, i kök, skafferier, altaner och andra förvaringsutrymmen. MyrNIX består av ett mycket finmalt fossilt stenmjöl (diatomit/kiselgur). Pulvret fastnar på myrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och ohyran torkar ut – därmed kan inte ohyran bli resistent. MyrNIX rekommenderas och används av proffs.

Gör så här

Mot krypande insekter inomhus: Applicera MyrNIX (7 g/m²) i springor och håligheter, såsom bakom golvlister och skåp, där insekter gömmer sig, på deras vandringsstråk samt direkt på insekterna om möjligt. Barriärbehandla insekternas ingångar och stråk med MyrNIX (7 g/m) som läggs i en rad med 1-3 cm bredd (max 2 m per dag). Upprepa behandlingen tidigast efter 7 dagar vid behov.

Mot myror utomhus: Applicera 5 g MyrNIX per myrbo, jämnt fördelat över boets ingångar. Barriärbehandla insekternas ingångar och stråk med MyrNIX (7 g/m) som läggs i en rad med 1-3 cm bredd. Upprepa behandlingen vid behov om all produkt burits bort av myrorna (tidigast efter 24 h). Högst 3 behandlingar per bo.

Mot röda hönskvalster i höns hus: Före applicering ska höns huset vara tomt på fjäderfä och rengjort. Applicera därefter MyrNIX (50 g/m²) på höns husets alla ytor, springor, håligheter och gångstråk där kvalstren kan gömma sig. Applicera på kvalstren direkt om möjligt. Upprepa behandling tidigast efter 7 dagar vid behov. Behandling kan göras förebyggande och av pågående utbrott. Beroende på angreppets omfattning och antal individer ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. Vid uppstädning och vid spridning till oönskade platser dammsug eller torka upp med fuktig trasa. Bäst effekt uppnås när produkten är torr. MyrNIX löses inte upp i vatten och kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet avdunstar.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Verksamt ämne: Kiselgur 100% CAS: 61790-53-2

Insekticid klass 3 reg.nr: 5754 1-1

MyrNIX levereras i 200 g flaska med pip för enkel spridning på svåråtkomliga ytor

MyrNIX har bedömning B från SundaHus
MyrNIX accepteras av Byggvarubedömningen

 **SundaHus**
BYGGVARUBEDÖMNINGEN