



TERGENT AB
Mörsaregatan 11
254 66 Helsingborg
Tel: 042-311 06 00
info@tergent.se
www.tergent.se



VermiNIX™ Hönskvalster

Bekämpningsmedel mot hönskvalster

VARFÖR

- Registrerat och godkänt bekämpningsmedel
- Ohyran kan inte bli resistent
- Ren naturprodukt – 100% kiselgur
- Fri från nervgift

VAD

- Bekämpar hönskvalster, loppor och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur

VAR

- Kan användas överallt där hönskvalster förekommer, exempelvis i höns huset under systemet, i redena, sandbaden samt på sittpinnarna

HUR

- Appliceras enligt anvisning för resp. område.



Om VermiNIX Hönskvalster

VermiNIX Hönskvalster består av kiselgur, eller diatomacéjord, ett naturligt fossilt mineral som bildats av sedimentering av kiselalger. VermiNIX Hönskvalster bekämpar ohyran utan att påverka fjäderfän. Det har en starkt utrotande effekt på röda hönskvalster och andra krypande skadeinsekter som myror och loppor! Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och den dör av uttorkning. VermiNIX Hönskvalster ska förvaras torrt. Blir produkten fuktig återfår den sina egenskaper när vattnet avdunstat.

Gör så här

Mot röda hönskvalster i höns huset: Före applicering ska höns huset vara tomt på fjäderfä och rengjort. Applicera därefter VermiNIX (50 g/m²) på höns husets alla ytor, springor, håligheter och gångstråk där kvalstren kan gömma sig. Applicera på kvalstren direkt om möjligt. Återbehandla tidigast efter 7 dagar vid behov. Behandling kan göras förebyggande och av pågående utbrott.

Mot krypande insekter inomhus: Applicera VermiNIX (7 g/m²) i springor och håligheter, såsom bakom golvlistor och skåp, där insekter gömmer sig, på deras vandringsstråk samt direkt på insekterna om möjligt. Barriärbehandla insekternas ingångar och stråk med VermiNIX (7 g/m) som läggs i en rad med 1–3 cm bredd (max 2 m per dag).

Upprepa behandlingarna tidigast efter 7 dagar vid behov.

Mot myror utomhus: Applicera 5 g VermiNIX per myrbo, jämnt fördelat över boets ingångar. Barriärbehandla insekternas ingångar och stråk med VermiNIX (7 g/m) som läggs i en rad med 1–3 cm bredd. Upprepa behandlingen vid behov om all produkt burits bort av myrorna (tidigast efter 24 h). Högst 3 behandlingar per bo.

Försiktighetsåtgärder vid användning

Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Verksamt ämne: Kiselgur 100% **CAS:** 61790-53-2

Behörighetsklass: 1 So, 2,3.

Insekticid klass 3 reg.nr: 5754-1-1

VermiNIX Hönskvalster levereras i 1 kg hink eller 15 kg säck